



ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
2014

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

Bitheolaíocht

Aonad Measúnaithe AS 2
ag measúnú
Orgánaigh agus Bithéagsúlacht
[AB121]



DÉ HAOINE 20 MEITHEAMH, MAIDIN

AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Tá leathanach breise línithe ag deireadh an scrúdpháipéir seo má tá sé de dhíth.

Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

Tá **Grianghraf 2.5** ar fáil duit le húsáid le **Ceist 5** sa pháipéar seo. Ná scríobh do fhreagraí ar an ghrianghraf seo.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 75 an marc iomlán don pháipéar seo.

Tá 60 marc ag dul do Roinn A. Tá 15 mharc ag dul do Roinn B. Léiríonn figiúirí idir lúbíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist. Cuirtear i gcuimhne duit go bhfuil gá le Gaeilge mhaith agus léiriú soiléir sna freagraí agat.

Úsáid téarmaíocht chruinn eolaíoch sna freagraí uile.

Ba chóir duit tuairim is **20 nóiméad** a chaitheamh ar Roinn B.

Glactar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach.


Measúnófar **caighdeán na cumarsáide scríofa** i Roinn B agus beidh 2 mharc ar a mhéad ag dul dó.

Don Scrúdaitheoir amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Marc
Iomlán

LEATHANACH BÀN



Cuir síos ar an dóigh a n-úsáidfidh an J-feadán le tiúchan na dé-ocsaíde carbóin sa tsampla aeir san fheadán ribeach a fháil amach.

[5]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

-
- [1]

	Limistéar innilte	Limistéar neamh-innilte
Innéacs Simpson (D)	0.32	0.56

-
-
-
-
- [2]

Ó Mheitheamh go Meán Fómhair, rinneadh an fásra sna limistéir innilte agus neamh-innilte araon a shampláil le líontán scaobtha, agus cuireadh roinnt pollghaistí i ngach limistéar fosta. Rinneadh seo d'fhonn monatóireacht a dhéanamh ar láithreacht an seadáin, *Ixodes ricinus*. Baineannaigh fhásta an speicis seo, pollann siad craiceann mamaigh mhóra amhail caoirigh, agus beathaíonn siad iad féin ar a gcuid fola go ceann roinnt laethanta. Ansin titeann siad de na mamaigh le huibheacha a bhreith ar an fásra agus mar sin de leanann siad den tsaolré.

Rinneadh taifead ar tharlú *Ixodes ricinus* sa tábla thíos.

Modh samplála	Meánlíon míosúil <i>Ixodes ricinus</i> a bailíodh	
	Limistéar innilte	Limistéar neamh-innilte
Líontán scaobtha	11.2	1.3
Pollghaiste	0.8	0

(c) Luaigh fáthanna leis na torthaí a fuarthas sa stáidéar seo.

[2]

(d) Daoine a bhíonn ag siúl trí fhásra fada ar mhóinteán le linn mhíonna an tsamhraidh, in amanna thig le *Ixodes ricinus* greim a bhaint astu. Dá thoradh seo, is féidir le baictéar is cúis le galar Lyme a bheith tarchurtha isteach san fhuil. Cuir síos ar **dhá** dhóigh ar leith a bhfreagróidh na fuilchealla bána don ionfhabhtú bhaictéarach.

1.

2.

[4]

- 5 Taispeánann **Grianghraf 2.5** brachfungas (*Trametes versicolor*) a fhaightear go coitianta ag fás ar chrainn mharbha i gcoillearnach amhail daracha nó feánna. Cosúil leis na fungais uilig, is líseatrófach é *Trametes versicolor*.

(a) Sainmhínigh an téarma 'líseatrófach'.

[1]

(b) Tá an brachfungas seo páirtchlúdaithe le horgánach eile (**A**), atá ina bhall den ghéineas *Sphagnum*. Gné atá le feiceáil go soiléir sa ghrianghraf in úsáid agat, sainathin an ríocht lena mbaineann *Sphagnum* agus luaigh fáth le do rogha.

[2]

Tá an chuid is mó den fhungas déanta de líon mór dual de hífí tanaí atá le fáil taobh istigh de thamhan stumpa an chrainn. Is é an 'brac', atá le feiceáil ar an taobh amuigh, an struchtúr atáirgeach a tháirgeann spóir sa tsamhradh mhall agus san fhómhar luath. Bíonn na spóir á séideadh ar shiúl ag an ghaoth, agus má thiteann siad ar fhoinsé bia atá fóirsteanach péacfaidh siad i ndálaí teo taise.

(c) An fhaisnéis seo in úsáid agat, mínigh trí oiriúnú den fhungas seo.

[3]


Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 6 Faoi chóras na hainmníochta déthearmaí, rangáítear an leon mar *Panthera leo* agus an tíogar mar *Panthera tigris*. Is baill iad an dá speiceas den fhine Felidae, den rang Mammalia, agus den ord Carnivora.

(a) I gcomhthéacs an rangaithe, sainmhínigh an téarma 'ord'.

_____ [1]

Taispeántar thíos léiriú i bhfoirm léaráide de thacsanomaíocht an leoin agus an tíogair. Seasann gach bosca do ghrúpáil dhifriúil thacsanomaíoch.



(b) Sainaithin na grúpálacha tacsanomaíocha atá léirithe ag na huimhreacha:

1 _____

2 _____

3 _____

[3]

(c) Rinneadh leoin fhireanna agus tíogair bhaineanna atá gafa i zúnna agus i bpáirceanna fiadhúlra a phórú le chéile agus táirgeadh sliocht a dtugtar leogair orthu. Luaigh cad chuige nach bhfuil pobail leogar ar bith le fáil san fhiántas.

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (iv) Tá difríocht de 10% idir seichimh na n-aimínaigéad don duine agus don mhoncaí réasas, agus tá difríocht de 20% idir é sin don duine agus don tsicín. Luaigh an dóigh a ndéanfaí na luachanna seo a léirmhíniú leis na gaolmhaireachtaí éabhlóideacha idir na trí speiceas a mholadh.

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

LEATHANACH BÁN

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

- 7 Baineadh úsáid as potaiméadar boilgeoige le himscrúdú a dhéanamh ar an ráta tógáil uisce ag péacán duilleach ó chrann óg seiceamair.

Baineadh úsáid as triomadóir gruaige le himscrúdú a dhéanamh ar éifeacht neart gaoithe agus teocht timpeallachta ar ráta gluaiseachta na boilgeoige gafa. Roghnaíodh ceachtar acu an socrú te nó an socrú fuar ar an triomadóir leis an teocht a athrú, agus athraíodh an fad slí idir an triomadóir gruaige agus an péacán le neart na gaoithe a athrú.

Taispeántar na torthaí sa tábla thíos.

Fad slí (d) idir triomadóir gruaige agus péacán/cm	Neart na gaoithe (1/d)/aonaid threallacha	Ráta gluaiseachta na boilgeoige/mm nóim ⁻¹	
		Socrú fuar ar an triomadóir gruaige	Socrú te ar an triomadóir gruaige
11	0.09	5.2	3.8
14	0.07	4.1	4.9
20	0.05	3.1	6.2
25	0.04	2.4	5.1
50	0.02	1.0	2.3

- (a) An teicníc ghrafach is cuí in úsáid agat, breac na sonraí thuas don fhortheideal:

“An dóigh a dtéann neart na gaoithe ag dhá theocht timpeallachta dhifriúla i bhfeidhm ar ráta gluaiseacht boilgeoige i bpotaiméadar a bhfuil péacán seiceamair ann.”


(Bain úsáid as an ghrafpháipéar thall)

Nótaíl: Ní gá duit an fortheideal a chur ar an ghraf.

[4]

- (b) Cuir síos ar, agus mínigh, an treocht a thaispeánann na torthaí don triomadóir gruaige ar an tsocrú fuar.

[3]



4

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

LEATHANACH BÁN


(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

- 8 Tá tábhacht le cainéil draenála maidir le leathbhá iomarcach agus tuilte ar thalamh feirme íseal a chosc. Mura ndéantar iad a ghlanadh, éiríonn siad mothrach le plandaí agus ní bhíonn siad ag feidhmiú chomh héifeachtach céanna. Is gnáthóga tábhachtacha fiadhúlra iad cainéil draenála mothracha dá leithéid, áfach.

Leis an fhásra a ghlanadh de thaobhanna dhá chainéal mhothracha, baineadh úsáid as dhá straitéis dhifriúla

- Glanadh an dá thaobh ar Chainéal 1
- Níor glanadh ach taobh amháin ar Chainéal 2

Rinneadh suirbhé ar líon iomlán na n-éan goir bogaigh ag gach cainéal ar feadh roinnt blianta roimh an ghlanadh, a tharla in 2006, agus ina dhiaidh.



- (a) Cuir síos ar na treochtaí i líon na n-éan don dá chainéal ó 2000 go 2012.

[3]

[illegible][illegible]

Leathanach breise línithe

[illegible]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc


SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

Bitheolaíocht GCE Ard-Fhotheastas (AF) (AS)

Aonad Measúnaithe AF (AS) 2
Orgánaigh agus Bithéagsúlacht
Samhradh 2014

Grianghraf 2.5 (le húsáid le Ceist 5)



Foinse: .Príomhscrúdaitheoir