



ADVANCED
General Certificate of Education
January 2012

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

Fisic

Aonad Measúnaithe A2 1

ag measúnú

Móiminteam, Fisic Theirmeach, Gluaisne
Chiorclach,

Ascaluithe agus Fisic Adamhach agus Núicléach

[AY211]



DÉ MÁIRT 24 Eanáir, Iarnóin

AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Freagair **gach** ceist.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist 7.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist.

Tarraingítear d'aird ar an Bhileog Sonraí agus Foirmlí atá istigh sa scrúdpháipéar seo.

Tá cead agat áireamhán leictreonach a úsáid.

Cuireann ceist 9 leis an mheasúnú shionoptach atá de dhíth don tsonraíocht. Ba chóir d'iarrthóirí tuairim is 20 nóiméad a chaitheamh ar an cheist seo.

Don Scrúdaitheoir amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**Marc
Iomlán**

[2]

- (b)** Tá suíochán teilgire i gcuid mhór d'aerárthaí míleata. Fágann an suíochán seo go dtig leis an phíolóta éalú ón aerárthach nuair atá éigeandáil ann.

Baintear úsáid as pléascadh i gcóras teilgthe amháin leis an suíochán, agus an píolóta ina shuí ann, a bhogadh go ceartingearach in airde.

- (i) Cén treo a mbogfaidh cabhail an aerárthaigh **mar gheall ar an chóras teilgthe a bheith curtha i bhfeidhm?** Mínigh an freagra.

[2]

- (ii) Déantar an córas teilgthe a thástáil in aerárthach atá ina stad ar rúidbhealach. Is é 200 kg mais an tsuíocháin agus is é 9100 kg, an suíochán san áireamh, mais iomlán an aerárthaigh. Nuair a scaoiltear an suíochán imíonn sé amach as an aerárthach faoi luas 180 ms^{-1} . Go teoiriciúil, cad é an luas tosaigh a bhíonn faoi chabhail an aerárthaigh?

Luas = _____ ms⁻¹ [3]

- (c)** Mínigh cad chuige nach féidir pléascadh den chineál seo a mheas mar “leagisteach” choíche.

[2]

[1]

[4]

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

3. Sceitse den ghraf a bhreactar:

[2]

4. An dóigh a bhfaightear luach dearbhnialais ina °C ón ghraf:

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(i) Taispeáin gurb é 17 rad s^{-1} go garbh treoluas uilleach an chasúir.

[1]

(ii) Ríomh treoluas líneach an chasúir agus é ag bogadh timpeall na conaire ciorclaí.

Treoluas líneach = _____ ms^{-1} [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc




Fior 3.1

- (ii) Ríomh méid an fhórsa a choinníonn an casúr sa ghluaisne chiorclach.

[3]

- (iii) Agus an casúr á luascadh timpeall, déanann an slabhra uillinn θ taobh thíos den chothromán mar a thaispeántar in **Fíor 3.2**.




Fíor 3.2

Mínigh, i dtéarmaí fórsaí, cad chuige nach féidir leis an slabhra a bheith cothrománach choíche.

[2]

- (c) Taispeánann **Fíor 3.3** radharc ón taobh thuas den chás atá thart timpeall ar an lúthchleasaí agus é ag rothlú thart. Léirigh ar **Fíor 3.3** an chéad suíomh i ndiaidh pointe A ar an chiorcal a mbeadh an lúthchleasaí ábalta an casúr a scaoileadh ann le go rachadh sé amach as an chás. Tarraing saighead lena thaispeáint cén treo a rachaidh an casúr ag an mheandar a scaoiltear é.



Fíor 3.3


[2]

4 (a) Sainmhínigh gluaisne armónach shimplí.

 [2]

(b) Is sampla de ghluaisne armónach shimplí é an dóigh a mbíonn ionad an bhairr láin ag athrú ar bhalla cuain mar gheall ar an taoide.

Taispeánann **Fíor 4.1** an t-athrú in ionad an bhairr láin, R .



Fíor 4.1

Is le **Cothromóid 4.1** a thugtar suíomh an bharr láin, R .

$$R = A \cos \omega t$$

Cothromóid 4.1

Athscríobh **Cothromóid 4.1** agus cuir isteach na luachanna uimhriúla le haghaidh na dtairiseach A agus ω .

$$R = \underline{\hspace{4cm}}$$

[4]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[4]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 5 (a) Sainmhínigh an leathré de shubstaint radaighníomhach.

_____ [1]

- (b) Anseo thíos tá an leathré de dhá iseatóp radaighníomhacha.


alúmanam-28 = 2.4 nóiméad

radón-219 = 3.96 s

- (i) Ba mhaith le múinteoir ceann amháin de na hiseatóip thuas a úsáid i dturgnamh sa rang leis an leathré de shubstaint radaighníomhach a fháil. Roghnaíonn an múinteoir alúmanam-28. Mínigh cad chuige ar roghnaigh an múinteoir an t-iseatóp seo de rogha ar radón-219.

_____ [2]

- (ii) Ba é 560 Bq gníomhaíocht tosaigh an alúmanaim-28. Ar **Fíor 5.1**, tarraing graf gníomhaíochta (A) ar am a mbeadh na mic léinn ag súil lena fháil ó na torthaí acu suas go dtí am (t) de 8 nóiméad.



Fíor 5.1

[3]

- 8 (a) Tugtar núicléis éadroma le chéile i bpróiseas an chomhleá. Meastar go gcaithfidh fuinneamh cinéiteach de 120 keV a bheith ag gach núicléas le go dtarlóidh comhleá. Ríomh an teocht a bhíonn de dhíth le fuinneamh cinéiteach go leor a sholáthar sa dóigh go dtiocfaidh na núicléis seo le chéile agus go dtarlóidh comhleá núicléach ansin.

Teocht = _____ K [3]

- (b) (i) Luaigh **dhá** bhuntáiste a bheadh ag imoibreoirí comhleá ar imoibreoirí eamhnaithe reatha.


[2]

- (ii) Sa dóigh go mbaintear an teocht ard a ríomhadh in (a) amach, caithear gaibhniú a bhaint amach. Cuir síos ar an dóigh a mbaintear gaibhniú amach san imoibreoir comhleá JET.

[3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Scrúdaítheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



Fíor 9.1

(iv) Ríomh luach don tairiseach B ón ghraf.

$B =$ _____

[3]

- (v) Ríomh luach d'fhuinneamh Fermi E_F nuair is é $3.2 \times 10^{29} \text{ m}^{-3}$ dlús an tsaorleictreoin.

$$E_F = \text{_____ eV}$$

[2]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

Fisic GCE

Bileog Sonraí agus Foirmlí do A2 1 agus A2 2

Luachanna na dtairiseach

luas an tsolais i bhfolús	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
ceadaíocht folúis	$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ F}^{-1} \text{ m} \right)$
bunlucht	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
tairiseach Planck	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
aonad maise adamhaí (aontaithe)	$1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$
mais leictreoin	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
mais prótóin	$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
gástairiseach mólarach	$R = 8.31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
tairiseach Avogadro	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
tairiseach Boltzmann	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
tairiseach na himtharraingthe	$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
luasghéarú saorthitime ar dhromchla an Domhain	$g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$
leictreonvolta	$1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$



AY211INS

D'fhéadfadh na foirmlí seo a leanas a bheith úsáideach le roinnt ceisteanna sa scrúdú a fhreagairt:

Meicnic

Imchoimeád fuinnimh	$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = Fs$ d'fhórsa tairiseach
Dlí Hooke	$F = kx$ (tairiseach lingeáin k)

Gluaisne armónach shimplí

Díláithriú	$x = A \cos \omega t$
------------	-----------------------

Fuaim

Leibhéal fuaimdhéine/dB	$= 10 \lg_{10} \frac{I}{I_0}$
-------------------------	-------------------------------

Tonnta

Trasnaíocht an dá fhoinsé	$\lambda = \frac{ay}{d}$
---------------------------	--------------------------

Fisic theirmeach

Meánfhuinneamh cinéiteach móilín	$\frac{1}{2} m \langle c^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$
Teoiric chinéiteach	$pV = \frac{1}{3} Nm \langle c^2 \rangle$
Fuinneamh teirmeach	$Q = mc\Delta\theta$

Toilleoirí

Toilleoirí ina sraith	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$
Toilleoirí treocheangailte	$C = C_1 + C_2 + C_3$
Amthairiseach	$\tau = RC$

Solas

Foirmle an lionsa

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

Formhéadú

$$m = \frac{v}{u}$$

Leictreachas

Difríocht poitéinsil losa

$$V = E - Ir \text{ (F.I.g. } E; \text{ Friotaíocht Inmheánach } r)$$

Roinnteoir poitéinsil

$$V_{\text{out}} = \frac{R_1 V_{\text{in}}}{R_1 + R_2}$$

Cáithníní agus fóitín

Meath radaighníomhach

$$A = \lambda N$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

Leathré

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{\lambda}$$

Cothromóid de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

An núicléas

Ga núicléach

$$r = r_0 A^{\frac{1}{3}}$$

