


N14/5/MATHL/HP2/SPA/TZ0/XX



88147226

International Baccalaureate®  
Baccalauréat International  
Bachillerato Internacional**MATEMÁTICAS**  
**NIVEL SUPERIOR**  
**PRUEBA 2**

Número de convocatoria del alumno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jueves 13 de noviembre de 2014 (mañana)

Código del examen

2 horas

8	8	1	4	-	7	2	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS**

- Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.
- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- En esta prueba es necesario usar una calculadora de pantalla gráfica.
- Sección A: conteste todas las preguntas en las casillas provistas.
- Sección B: conteste todas las preguntas en el cuadernillo de respuestas provisto. Escriba su número de convocatoria en la parte delantera del cuadernillo de respuestas, y adjúntelo a este cuestionario de examen y a su portada utilizando los cordeles provistos.
- Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán ser exactas o aproximadas con tres cifras significativas.
- Se necesita una copia sin anotaciones del *cuadernillo de fórmulas de Matemáticas NS y de Ampliación de Matemáticas NS* para esta prueba.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es [120 puntos].



16EP01



















## 9. [Puntuación máxima: 8]

La compactibilidad es una propiedad que indica cuán compacta es una región cerrada.

La compactibilidad  $C$  de una región cerrada se puede definir mediante  $C = \frac{4A}{\pi d^2}$ , donde  $A$  es el área de la región y  $d$  es la distancia máxima entre dos puntos cualesquiera de la región.

En el caso de una región circular,  $C = 1$ .

Considere un polígono regular de  $n$  lados construido de manera tal que los vértices pertenecen a la circunferencia de un círculo de diámetro  $x$  unidades.

(a) Si  $n > 2$  y par, muestre que  $C = \frac{n}{2\pi} \operatorname{sen} \frac{2\pi}{n}$ . [3]

Si  $n > 1$  e impar, se puede mostrar que  $C = \frac{n \operatorname{sen} \frac{2\pi}{n}}{\pi \left( 1 + \cos \frac{\pi}{n} \right)}$ .

(b) Halle el polígono regular con el menor número de lados para el que la compactibilidad es mayor que 0,99. [4]

(c) Comente brevemente sobre si  $C$  es una buena medida de la compactibilidad. [1]

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)





**NO** escriba soluciones en esta página.

### SECCIÓN B

Conteste **todas** las preguntas en el cuadernillo de respuestas provisto. Empiece una página nueva para cada respuesta.

10. [Puntuación máxima: 12]

Considere el triángulo PQR, donde  $\hat{Q}PR = 30^\circ$ ,  $PQ = (x+2)$  cm y  $PR = (5-x)^2$  cm, donde  $-2 < x < 5$ .

(a) Muestre que el área del triángulo,  $A$  cm<sup>2</sup>, viene dada por  $A = \frac{1}{4}(x^3 - 8x^2 + 5x + 50)$ . [2]

(b) (i) Indique  $\frac{dA}{dx}$ .

(ii) Verifique que  $\frac{dA}{dx} = 0$  para  $x = \frac{1}{3}$ . [3]

(c) (i) Halle  $\frac{d^2A}{dx^2}$  y, a partir de lo anterior, justifique que el área máxima del triángulo PQR se obtiene cuando  $x = \frac{1}{3}$ .

(ii) Indique el área máxima del triángulo PQR.

(iii) Halle QR cuando el área del triángulo PQR alcanza su valor máximo. [7]



**NO** escriba soluciones en esta página.

**11.** [Puntuación máxima: 10]

El número de quejas que recibe cada día el servicio de atención al cliente de una tienda por departamentos sigue una distribución de Poisson de media 0,6 .

- (a) En un día elegido al azar, halle la probabilidad de que
- (i) no haya ninguna queja;
  - (ii) haya al menos tres quejas. [3]
- (b) En una semana de cinco días elegida al azar, halle la probabilidad de que no se reciba ninguna queja. [2]
- (c) En un día elegido al azar, halle el número más probable de quejas que se reciben. Justifique su respuesta. [3]

Esta tienda por departamentos introduce una nueva normativa para mejorar el servicio de atención al cliente. El número de quejas que recibe cada día el servicio de atención al cliente ahora sigue una distribución de Poisson de media  $\lambda$  .

En un día elegido al azar, la probabilidad de que no se reciba ninguna queja es ahora igual a 0,8.

- (d) Halle el valor de  $\lambda$  . [2]

**12.** [Puntuación máxima: 11]

Ava y Barry juegan a un juego con una bolsa que contiene una canica verde y dos canicas rojas. Cada jugador, por turnos, va sacando al azar una canica de la bolsa, anota el color y vuelve a meter la canica en la bolsa. Ava gana el juego si saca una canica verde. Barry gana el juego si saca una canica roja. Ava empieza a jugar.

Halle la probabilidad de que


- (a) Ava gane el juego en su primer turno; [1]
- (b) Barry gane el juego en su primer turno; [2]
- (c) Ava gane el juego en uno de sus tres primeros turnos; [4]
- (d) Ava gane el juego en algún momento. [4]



**NO** escriba soluciones en esta página.

13. [Puntuación máxima: 16]

En la siguiente figura se muestra la sección transversal vertical de un contenedor.



Los lados curvos de dicha sección transversal vienen dados por la ecuación  $y = 0,25x^2 - 16$ . Las secciones transversales horizontales son circulares. El contenedor tiene una altura de 48 cm.

- (a) Si el contenedor se llena de agua hasta una altura de  $h$  cm, muestre que el volumen del agua,  $V$  cm<sup>3</sup>, viene dado por  $V = 4\pi\left(\frac{h^2}{2} + 16h\right)$ . [3]

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)



**NO** escriba soluciones en esta página.

(Pregunta 13: continuación)

El contenedor, que inicialmente está lleno de agua, empieza a gotear a través de un pequeño agujero a una razón que viene dada por  $\frac{dV}{dt} = -\frac{250\sqrt{h}}{\pi(h+16)}$ , donde  $t$  se mide en segundos.

(b) (i) Muestre que  $\frac{dh}{dt} = -\frac{250\sqrt{h}}{4\pi^2(h+16)^2}$ .

(ii) Indique  $\frac{dt}{dh}$  y, a partir de lo anterior, muestre que  $t = \frac{-4\pi^2}{250} \int \left( h^{\frac{3}{2}} + 32h^{\frac{1}{2}} + 256h^{-\frac{1}{2}} \right) dh$ .

(iii) Halle el tiempo que tarda en vaciarse el contenedor, aproximado al número entero de minutos más próximo. (60 segundos = 1 minuto) [10]

Una vez que está vacío, se vuelve a echar agua en el contenedor a una razón de  $8,5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ .

Simultáneamente, el contenedor sigue goteando a una razón de  $\frac{250\sqrt{h}}{\pi(h+16)} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ .

(c) Utilizando un gráfico aproximado apropiado, determine la altura a la que acaba estabilizándose el nivel del agua en el contenedor. [3]



**NO** escriba soluciones en esta página.

14. [Puntuación máxima: 11]

En el triángulo ABC,

$$3 \operatorname{sen} B + 4 \operatorname{cos} C = 6 \quad \text{y}$$

$$4 \operatorname{sen} C + 3 \operatorname{cos} B = 1.$$

(a) Muestre que  $\operatorname{sen}(B + C) = \frac{1}{2}$ .

[6]

Robert conjetura que  $\hat{C}\hat{A}\hat{B}$  puede tener dos valores posibles.

(b) Muestre que la conjetura de Robert es incorrecta, demostrando que  $\hat{C}\hat{A}\hat{B}$  tiene solo un valor posible.

[5]

